



# ข่าวปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4131 โทรสาร 0-2653-4920

## กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการเร่งด่วน สำหรับป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือ โรคคอบวม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหันทำให้สัตว์สุขภาพอ่อนแอ แนะนำเกษตรกรจัดเตรียมโรงเรือน วัสดุปรุรองนอน และอาหารสัตว์ให้เพียงพอ

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พบโคเนื้อและกระบือป่วยเป็นโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ตาพระยา วัฒนานครและอรัญประเทศ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในอำเภอตาพระยาเป็นระยะทางรัศมีรอบจุดเกิดโรค 5 กิโลเมตรเรียบร้อยแล้วและระดมนายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit; DHHU) และด่านกักสัตว์ร่วมเป็นชุดเฉพาะกิจฉีดวัคซีนให้โคกระบือทั้งจังหวัด ทั้งนี้จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้

โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียเป็นโรคติดต่อสำคัญในกระบือ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อชนิดนี้สามารถอยู่ในระบบทางเดินหายใจสัตว์ปกติได้ สัตว์ที่ได้รับเชื้อจะไม่แสดงอาการป่วยแต่เมื่ออยู่ในภาวะเครียด เช่น อากาศเปลี่ยนแปลง ขาดอาหาร การจัดการการเลี้ยงไม่ดี การแรงงานมากเกินไปหรือการเคลื่อนย้ายสัตว์จนร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำลงจะแสดงอาการป่วยออกมาและขับเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนอาหารหรือน้ำทำให้สัตว์ตัวอื่นติดโรคจากการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อ สัตว์ป่วยจะมีอาการดังนี้ หายใจหอบ เสียงดัง ยืดคอไปข้างหน้า น้ำลายฟูมปาก ไข้สูง หยุดกินอาหาร คอหรือหน้าบวม แข็งและร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตกะทันหันก่อนแสดงอาการ อย่างไรก็ตามโรคนี้อาจป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้งโดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคสำหรับกระบือทุกตัวและโคที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ กรมปศุสัตว์จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วน สำหรับฟาร์มหรือฝูงสัตว์ที่มีโรคระบาดแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคออกนอกพื้นที่ ดังนี้

1. จัดพื้นที่เฉพาะสำหรับกักแยกสัตว์ป่วยให้ห่างจากสัตว์ปกติมากที่สุด แยกอุปกรณ์สัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติ แยกบุคคลดูแลสัตว์ป่วย หากไม่สามารถทำได้ ให้จัดลำดับโดยทำกิจกรรมกับสัตว์ป่วยเป็นลำดับสุดท้าย
2. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นคอกเป็นประจำ
3. รักษาสัตว์ป่วยด้วยยาปฏิชีวนะที่ให้ผลดีในการรักษา นาน 5-7 วันและให้ยาอื่นๆตามอาการ เช่น ยาขยายหลอดลม ยาละลายเสมหะ ยาแก้อักเสบ เป็นต้น รวมถึงฉีดยาปฏิชีวนะให้สัตว์ร่วมฝูงสัตว์ป่วย
4. ห้ามฆ่าแหละหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ตายเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายเนื้อมาลายซากสัตว์ให้ถูกหลักโดยกำจัดซาก ณ สถานที่ที่สัตว์ตาย ด้วยการเผาหรือฝังซากสัตว์ไว้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร และใช้ยาฆ่าเชื้อที่ทำลายเชื้อโรคได้

**สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีสัตว์ป่วย สามารถป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ ดังนี้**

1. งดนำสัตว์จากพื้นที่ระบาดเข้ามาเลี้ยง อย่างน้อย 1 เดือน
2. ฉีดวัคซีนให้กระบือและโคอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปปีละ 1 ครั้ง
3. เข้มงวดการจัดการเพื่อป้องกันโรคเข้าฟาร์ม เช่น

3.1. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทสำหรับใช้เฉพาะภายในฟาร์ม และเดินผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน

3.2. ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูลสัตว์ เข้าภายในฟาร์มเด็ดขาด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงโคมากที่สุด

3.3. ซื้อฟืชอาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรค

**ทำยนี้** อธิปไตยกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ฝ้าสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะกระบือและโคเนื้อ หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในท้องที่หรือที่ dvarroom โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 4144-5

---

ข้อมูล / ข่าว : ส่วนควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์