



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ โทร.๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๕

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๙ / ๖๒๖๓๐๘ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
รอบที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ ๑/๒๕๖๘ ในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพ โคนมทั้งประเทศมีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้ และลดปริมาณเชื้อไวรัสในพื้นที่ กรมปศุสัตว์จึงขอให้ท่านดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ ๑/๒๕๖๘ ให้เกษตรกรทราบ ร่วมกับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย ความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม

๒. จัดประชุมร่วมกับสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อขอความร่วมมือ และชี้แจงแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย การบันทึกการฉีดวัคซีนการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง และร่วมกันวางแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกราย

๓. จัดทำแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกราย โดยแบ่งเป็น ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่มีประชากรโคนมหนาแน่น หรือเกิดโรคซ้ำซาก และพื้นที่ทั่วไป

๓.๑ พื้นที่ที่มีประชากรโคนมหนาแน่น หรือเกิดโรคซ้ำซาก จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ ลำพูน นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ให้แบ่งกลุ่มเกษตรกรตามความสามารถในการฉีดวัคซีนเป็น ๓ กลุ่ม (A, B, C)

A: เกษตรกรที่สามารถฉีดวัคซีนให้โคนมได้ครบทุกตัว

B: เกษตรกรที่สามารถฉีดวัคซีนโคนมได้ไม่ครบทุกตัว

C: เกษตรกรที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ หรือเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยทุกปี

๓.๒ พื้นที่ทั่วไป จังหวัดที่มีโคนม ๔๓ จังหวัด

๔. ฉีดวัคซีนให้กับโคนมทุกตัวที่มีอายุ ๔ เดือนขึ้นไป สำหรับโคนมที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกภายใน ๓ - ๔ สัปดาห์

๔.๑ เกษตรกรกลุ่ม A เกษตรกรดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับโคนมของตนเองทุกตัว

๔.๒ เกษตรกรกลุ่ม B เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม อาสาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์โคนม ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับโคนมที่เกษตรกรไม่สามารถฉีดวัคซีนเอง

๔.๓ เกษตรกรกลุ่ม C และพื้นที่ทั่วไป ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม อาสาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์โคนม ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับโคนมของเกษตรกรทุกตัว

๔.๔ ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม และอาสาปศุสัตว์ เป็นผู้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ลูกโคนมทุกตัว

๕. การบันทึกการฉีดวัคซีน

๕.๑ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการฉีดวัคซีน และบันทึกการฉีดวัคซีนตามแบบบันทึกการฉีดวัคซีน (เอกสารแนบ ๑) และบัตรประจำตัวโคนม (พท.๑) หรือเอกสารใดๆที่สามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนได้

๕.๒ กรณีที่เกษตรกรไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้เกษตรกรลงนามในแบบฟอร์มขอความยินยอม (consent form) (เอกสารแนบ ๒)

๖. การติดตามการฉีดวัคซีนในเกษตรกรกลุ่ม A โดยขอความร่วมมือสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ดังนี้

๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิก และติดตามให้มารับวัคซีนให้ครบถ้วน ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากได้รับวัคซีนจากกรมปศุสัตว์

๖.๒ ติดตามการฉีดวัคซีนโดยให้เกษตรกรส่งคืนขวดวัคซีน และเข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว พร้อมบันทึกการคืน หรือรายงานการฉีดวัคซีนในรูปแบบภาพถ่าย หรือคลิปการฉีดวัคซีน ผ่านทางกลุ่มไลน์ของสหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ

๖.๓ สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบรวบรวมแบบบันทึกการฉีดวัคซีนจากเกษตรกรกลุ่ม A ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

๗. การรายงานผลการฉีดวัคซีน

ดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๗.๑ ปศุสัตว์อำเภอ รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามแบบ กคร.๔ (เอกสารแนบ ๓) เก็บหลักฐานไว้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และส่งสำเนาให้ปศุสัตว์จังหวัด

๗.๒ ปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมข้อมูลจากแบบ กคร.๔ และบันทึกสรุปผลการฉีดวัคซีนลงในแบบกคร.๕/๑ (เอกสารแนบ ๔) ส่งให้ปศุสัตว์เขต

๗.๓ ปศุสัตว์เขต สรุปผลการฉีดวัคซีนลงในแบบกคร.๕/๒ (เอกสารแนบ ๕) ส่งให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

๘. มาตรการเสริมเพื่อลดความเสี่ยง

๘.๑ ตั้งจุดตรวจและทำลายเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนพื้นที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่นสูง พื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ตลาดนัดคํ้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ และคอกพักสัตว์โรงฆ่าสัตว์

๘.๒ ให้ศูนย์รับนํ้านมดิบ และสหกรณ์โคนมเข้มงวดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อที่ยานพาหนะ และถังนม

๘.๓ เน้นย้ำให้เกษตรกรชะลอการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าฟาร์ม หากจำเป็นให้กักสัตว์เพื่อสังเกตอาการ ๑๕ วัน ก่อนเข้าร่วมฝูง

๘.๔ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คน หรือรถรับซื้อรก มูลโค ลูกวัว และรถขนโค

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญญกฤษ ปินประสงค์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

